

¡USTED TAMBIÉN puede quedar infectado!

por Donald D. Schroeder

Con rapidez extraordinaria, las nuevas enfermedades venéreas están sobrepasando los flagelos anteriores.

¡Reduzca sus probabilidades de sufrir este mal!

LA HUMANIDAD está luchando ahora contra las enfermedades infecciosas más siniestras de este siglo, o de cualquier siglo.

Las enfermedades transmitidas por la vía sexual, a saber, SIDA, clamidia, herpes genital y una veintena más, muchas de ellas desconocidas en el pasado, están fuera de control en muchos países.

Millones de personas que no supieron de la llamada "epidemia silenciosa" han despertado repentinamente y dolorosamente ante el problema más grave de enfermedades contagiosas en nuestro tiempo.

El flagelo de la sífilis y la gonorrea ha dejado de ser el más común o el más grave. Y el comportamiento sexual de la víctima no siempre es factor en el contagio de algunas de estas enfermedades nuevas.

Esto es lo que inquieta a las autoridades de salud y lo que muchas personas no han entendido.

La epidemia del SIDA

La enfermedad conocida como SIDA (síndrome de inmunodeficiencia

adquirida, conocida también por su sigla en inglés AIDS) apareció en un puñado de homosexuales a mediados de 1981. Desde entonces el mal ha estallado hasta convertirse en una epidemia mundial de proporciones alarmantes.


Las consecuencias serán aterradoras, dicen funcionarios de salud, pues el virus, que antes afectaba principalmente a los varones homosexuales y bisexuales, así como a drogadictos que compartían agujas infectadas y a hemofílicos que recibían el virus en transfusiones de sangre infectada, se ha extendido ya a otros sectores de la sociedad, debido principalmente a la promiscuidad sexual y las inyecciones contaminadas.

"El SIDA no es una enfermedad de homosexuales únicamente, sino una enfermedad transmitida por vía sexual", dice el Dr. James Curran, destacada autoridad norteamericana.

Actualmente en los Estados Unidos, el Canadá, Europa y Australia el 75 por ciento de

los casos de SIDA ocurren en varones homosexuales y bisexuales. En los Estados Unidos alrededor del 17 por ciento ocurren en personas que se inyectan drogas por vía intravenosa. Los exámenes de sangre que revelan una reacción de anticuerpo al virus del SIDA indican que aproximadamente el 67 por ciento de los hombres homosexuales de la ciudad de San Francisco tienen indicios de haber estado expuestos al virus; la cifra para Los Angeles es del 50 por ciento.

Algunos estudios en drogadictos que se inyectan por vía intravenosa arrojan resultados positivos para el contacto con el virus del SIDA



El SIDA destruye el sistema inmunológico. Su tasa de reproducción es superior a la de cualquier virus conocido y sus muchas variaciones genéticas impiden la elaboración de una vacuna.

El virus del SIDA (las esferas de centro oscuro) atacan una célula "T".

en un 50 a 60 por ciento de los sujetos examinados (en otras palabras, estaban ya infectados). Se sabe que muchas prostitutas se inyectan drogas.

La cuestión no es si el SIDA puede o no transmitirse mediante la actividad heterosexual convencional. Sí puede. La preocupación ahora es cuán rápidamente se extenderá entre los heterosexuales no monógamos. La prostitución y las relaciones bisexuales son factores principales en el contagio de los heterosexuales. En algunos lugares, hasta el 30 por ciento de los nuevos casos de SIDA se presentan en personas heterosexuales.

Una infección grande de SIDA destruye rápidamente la reacción inmunológica del organismo, dando paso a las infecciones "oportunistas" de diversos virus y bacterias. En algunos casos, la enfermedad causa una forma rara de cáncer de la piel llamada sarcoma de Kaposi. Se cree que el SIDA, en infecciones menos masivas, puede causar otras enfermedades, pero aún no se conoce toda la patología.

"No estamos viendo sino la punta del témpano", advierten las autoridades de salud.

"En cuanto a inquietud, va a ser un problema de todos", afirma el Dr. Neil R. Schram, presidente del Grupo de Trabajo sobre el SIDA (Los Ángeles, EE.UU.). "En términos numéricos, lo que se avecina es aterrador", dijo otro funcionario. En muchas partes, el número de infecciones se ha estado duplicando cada año.

A escala mundial, el SIDA ha atacado ya a más de 15.000 víctimas, más de 12.000 de ellas en los Estados Unidos. Según cálculos de algunas autoridades, entre 500.000 y un millón de personas en los Estados Unidos ya han sido infectadas con el virus del SIDA llamado HTLV-III.

Algunas autoridades calculan que el 10 por ciento o más de los infectados con el virus del SIDA presentarán síntomas graves y morirán en el término de cinco años. La ciencia médica no tiene curación para esta enfermedad, que parece causar un índice de mortalidad del 100 por ciento una vez que se presentan síntomas graves.

Médicos científicos señalan una

epidemia secundaria del virus del SIDA. Entre las víctimas se encuentran los cónyuges o compañeros de personas promiscuas, así como drogadictos que se inyectan las venas y personas que reciben transfusiones de sangre contaminada. Ya se está viendo el mal en los fetos de mujeres infectadas. Además, en cierta clínica de fertilidad varias mujeres han contraído el


contacto íntimo en que el virus pueda pasar al interior de la otra persona.

En algunas partes del África el SIDA es una enfermedad heterosexual que afecta a hombres y mujeres en proporciones más o menos iguales.

Los funcionarios de salud han borrado a los haitianos de la lista de alto riesgo, pues los investigadores

EL SIDA EN LOS EE.UU.

(Número de casos informados hasta el 5 de agosto de 1985)



Fuente de información: Centros para el Control de Enfermedades (EE.UU.)

virus del SIDA al recibir inseminación artificial.

Cómo se propaga

Cuando el SIDA se diagnosticó por vez primera en 1981, se le denominó "la plaga de los homosexuales" porque sus víctimas eran en su mayoría varones homosexuales y porque parecía transmitirse por el contacto sexual anal. Este acto anormal frecuentemente hace sangrar y ofrece un conducto muy propicio para la entrada del virus a un nuevo huésped.

Parece que el SIDA no se propaga en las tasas del baño, en un estornudo, por un apretón de manos ni por estar cerca de la víctima. No se ha demostrado definitivamente el contagio ambiental o doméstico. Parece que la enfermedad requiere para su propagación un

han descubierto que la mayoría de los haitianos que contrajeron SIDA lo contrajeron por su actividad homosexual, por el uso de agujas contaminadas o por el contacto sexual con prostitutas infectadas... o bien como resultado del contacto sexual con algún miembro de estos grupos de alto riesgo. En palabras de un funcionario de salud, "el problema básico no es uno de nacionalidad sino de promiscuidad".

El virus del SIDA, como el de la influenza, sufre mutaciones o transformaciones constantes. El virus causante de esta enfermedad mortal existe en unas 100 formas, característica inquietante que hace muy difícil elaborar una vacuna eficaz.

Otra característica especialmente aterradora de esta enfermedad es su largo periodo de incubación,

hasta de 10 años, antes de manifestarse. Una persona infectada y sexualmente activa, sea varón o mujer, puede ser portadora del virus durante muchos años, llevándolo ya sea en forma latente (inactiva) en las células de su cuerpo o

pasadas ha traído un riesgo para millares de personas no monógamas. Muchas personas están propagando uno de los virus más mortíferos, y posiblemente otras enfermedades venéreas, sin saberlo. El riesgo guarda proporción directa con el número de parejas que hayan tenido, sean heterosexuales u homosexuales.

El Dr. Mervyn Silverman, presidente de la Conferencia Norteamericana de Funcionarios Locales de Salud, dice que la amenaza del SIDA, unida al temor por el herpes genital y otras enfermedades venéreas, ha sido un freno al libertinaje sexual de los últimos 20 años. "Creo que la revolución sexual está

gonorrea, desconciertan a la ciencia médica porque no ceden al tratamiento con antibióticos. No siempre son curables, y producen dolor crónico, esterilidad, embarazos anormales, niños lesionados y cáncer.

Empero, es muy importante hacer ciertas aclaraciones acerca de estas enfermedades para prevenir la autorreprimación y la vergüenza injustificadas.

Hay casos en que estas enfermedades se adquieren sin que haya habido promiscuidad, infidelidad conyugal ni otras indiscreciones sexuales. Algunas ETS se presentan en parejas fieles o sin que medie contacto sexual alguno. No todas las infecciones de ETS se pueden evitar, aun entre las personas más fieles o morales. Algunos de estos gérmenes se transmiten en transfusiones de sangre contaminada, inyecciones hipodérmicas o en alimentos o aguas contaminadas.

Hombres y mujeres vírgenes, así como cónyuges fieles, han contraído casos de moniliasis, uretritis, tricomoniasis o verrugas acuminadas. La sarna, causada por un ácaro, y los piojos son infestaciones que se adquieren no solamente por el contacto sexual sino por el contacto corporal estrecho con personas afectadas o con ropas o sábanas contaminadas.

La moniliasis es el resultado del desarrollo excesivo de cierto organismo (una levadura) que vive normalmente sin causar daño entre la "flora" de la región genital. Al perturbarse el equilibrio microbiótico natural, ya sea por tensión emocional, drogas, embarazo o ropa apretada, el organismo puede desarrollarse excesivamente y ocasionar una infección molesta que se transmite por la vía sexual.

Otra enfermedad, llamada uretritis no gonocócica, es causada por diversos organismos, algunos conocidos, otros no. Sus causas y vías de propagación son similares.

Aunque ciertos casos de ETS no tienen nada que ver con comportamiento inmoral, la epidemia en su mayor parte se debe a la conducta sexual libre y promiscua. Las autoridades de salud calculan que entre el 20 y el 30 por ciento de las personas muy activas sexualmente

(Continúa en la página 23)

Las infecciones de *chlamidia tracomatis*, más comunes que la gonorrea y de una patología sutil, causan esterilidad e inflamaciones en los adultos, y en los niños, infección en los ojos, ceguera y neumonía.

Un cultivo de tejido humano infectado de clamidia.

bien en una etapa activa en su sangre. En la etapa activa, el virus puede pasar al compañero o compañera sexual aunque el portador parezca sano y sin síntomas.

Parece que el sistema inmunológico de algunas personas afectadas es capaz de dominar el virus temporalmente y llevarlo a un estado de latencia. Sin embargo, algunos investigadores piensan que permanecerá en el cuerpo toda la vida, como el virus del herpes simplex. Las pruebas de sangre frecuentemente señalan la presencia de anticuerpos al virus HTLV-III (aunque también suele haber resultados positivos falsos). Y aunque se presenten resultados positivos, la medicina no tiene manera de pronosticar el rumbo que seguirá la enfermedad. Algunos piensan que el virus puede reactivarse y comenzar a circular en la sangre, o convertirse en una infección activa parcial o completa si el organismo se debilita por enfermedades o tensiones.

El virus del SIDA causa lesiones graves al cerebro y al sistema nervioso, además de anular el sistema inmunológico. Por lo menos la mitad de los pacientes con SIDA avanzada sufren síntomas como pérdida de la memoria, dificultad para hablar y pensar, y aun demencia.

La revolución sexual de las déca-

Por qué aparecen enfermedades nuevas

Las autoridades de salud están preocupadas por una lista larga y creciente de patógenos transmitidos por la vía sexual, muchos de los cuales se han reconocido apenas en la última década.

La expresión "enfermedad venérea" está dando paso al término "enfermedad transmitida sexualmente", o lo que es más preciso, "enfermedad transmisible por vía sexual" (ETS). Este término describe mejor el problema, ya que incluye no sólo las enfermedades transmitidas casi exclusivamente por el contacto sexual sino otras que pueden transmitirse de esta manera y también por falta de higiene u otros medios no sexuales.

Según los cálculos de la Asociación Norteamericana de Salud Social, 10 millones de norteamericanos visitan anualmente clínicas y consultorios médicos a causa de estas enfermedades. En Inglaterra se tratan más de medio millón de nuevos casos de ETS.

Uno de cada cuatro estadounidenses entre los 15 y los 55 años de edad contraerá una enfermedad transmisible por vía sexual en algún momento de su vida.

Algunas de las ETS más recientes, al contrario de la sífilis y la

Infectado

(Viene de la página 6)

padece una o más de estas enfermedades.

Una nueva causa de esterilidad

Los investigadores han descubierto con alarma un agente infeccioso más importante que la gonorrea como causa de esterilidad e infecciones genitales.

El patógeno de esta ETS, la de mayor aumento actualmente, se llama *chlamydia trachomatis*. Se calcula que el año pasado hubo dos millones de norteamericanos afectados de gonorrea, pero de tres a cuatro millones afectados de clamidia. Esta enfermedad produce inflamación pélvica en la mujer y, al igual que la gonorrea, es una causa principal de esterilidad.


Según una fuente autorizada, 150.000 de los varios millones de mujeres norteamericanas que tienen la bacteria quedarán estériles. Se calcula que un 5 por ciento de

las mujeres universitarias de los Estados Unidos tienen la infección.

Antes de identificarse claramente, se pensaba que este agente era inespecífico y relativamente inocuo, y se trataba con antibióticos generales como cualquier infección no gonocócica de la uretra o la vagina. Pero ahora se sabe que la clamidia es una de las principales causas de inflamación pélvica e infertilidad en los adultos, y de ceguera y neumonía en los recién nacidos.

La gonorrea se puede tratar con penicilina, pero no así la clamidia. El persistente organismo no se cura con menos de 10 a 14 días de tetraciclina o eritromicina, ambas drogas muy fuertes y costosas.

Los primeros síntomas de la infección de clamidia, si los hay, sue-



Millones de personas con herpes genital ven su vida personal y social afectada por los dolores, las ampollas, la fiebre o las supuraciones. Se cree que el virus tiene una relación con el cáncer del cuello uterino.

El virus del herpes en un tejido humano.

len pasar inadvertidos, aunque la lesión puede ser irreversible. Ciertos estudios muestran que el 20 por ciento de los varones y el 30 a 40 por ciento de las mujeres afectadas de gonorrea también tienen clamidia.

Las verdaderas víctimas de la explosión de ETS son los bebés y las madres y futuras madres. Un bebé que pasa por un canal del parto infectado con clamidia y que se

Herpes: flagelo de la revolución sexual

En la década del 70 el herpes genital explotó repentinamente como una verdadera epidemia entre las personas de vida licenciosa.

Hoy esta enfermedad viral compete con la gonorrea y la clamidia por el primer lugar entre las enfermedades transmisibles por vía sexual (ETS). Las autoridades de salud calculan en muchos millones el número de personas afectadas por este virus, que persiste toda la vida.

Aunque la enfermedad rara vez resulta fatal en los adultos, muchas personas afectadas de herpes genital presentan ampollas infecciosas que alteran su vida personal y social. Aunque las lesiones (muchas veces dolorosas) pueden aliviarse con tratamiento médico, la enfermedad es incurable porque el virus se retrae en

la profundidad de los tejidos.

Ningún tratamiento hasta ahora ha logrado acabar con el virus. "El herpes genital es la enfermedad que mantiene monogamos a muchos especialistas", dice un funcionario de salud conocedor del tema.

Los adultos con herpes ven perturbada su vida emocional y socialmente, pero la tragedia de los recién nacidos es aun peor. Un motivo de inquietud en los círculos médicos es el aumento en el herpes genital contraído al nacer. La mitad de los niños que pasan por un canal del parto infectado con herpes contraen la infección. El 25% mueren o sufren lesiones cerebrales. Se sospecha que el virus es causa de aborto. Además, existe una gran correlación entre la infección de herpes genital en mujeres y el cáncer del

cuello uterino, aunque el virus todavía no ha sido señalado como causa absoluta.

Diferencias importantes

Es importante distinguir entre los diferentes tipos de virus de herpes. Algunos manifiestan síntomas diferentes o afectan diferentes partes del cuerpo.

El herpes simplex, tipo 1, es un virus común de transmisión no venérea que causa granitos o aftas en los labios, la boca o la cintura. Suele transmitirse por el contacto personal, el beso o por usar las mismas vajillas o cubiertos durante los periodos de infección activa. El herpes simplex, tipo 1, se halla con bastante frecuencia en adultos y niños.

El herpes genital o herpes simplex, tipo 2, en cambio, se transmite casi siempre por contacto sexual. Las

prácticas bucogenitales también propagan el virus a otras partes del cuerpo. La autoinoculación desde una parte infectada puede trasladar el virus a otras aberturas mucomembranasas. Es peligroso transferir una infección de cualquier tipo de herpes a los ojos.

Ante el aumento rápido del herpes genital, la Organización Norteamericana de Salud Social ha establecido un programa especial de ayuda e información. Las víctimas de herpes pueden escribir a la siguiente dirección: HRC, Apartado Postal 100, Palo Alto, California, 94302 (se pide incluir con la solicitud un sobre con su dirección). En otros países se aconseja comunicarse con una clínica que se especializa en el tratamiento de enfermedades transmisibles por vía sexual o con alguna entidad de salud pública. □

infecte con este organismo, tiene un 50 por ciento de probabilidades de contraer neumonía o una enfermedad de los ojos.

La infección por clamidia no solamente causa esterilidad sino también estrechez de los órganos de reproducción en la mujer. Ha sido señalada como causa del aumento alarmante en el número de embarazos ectópicos (o sea en las trom-

rones que buscan tratamiento han sido el factor principal que permite identificar y tratar a sus parejas, el 80 por ciento de las cuales no presentan síntomas precoces. Muchas de estas mujeres infectadas sólo buscan tratamiento cuando su salud ya está seriamente afectada.

Las ETS entre homosexuales

La tragedia del SIDA ha sacado a

que decir estas cosas porque nadie las dice!

Protéjase

Muchas personas se han engañado creyendo que su vida sexual no es promiscua. Pretenden darle una definición nueva a la promiscuidad que les haga sentirse bien aunque no sean monógamas ni vírgenes.

Pero los funcionarios de salud informan que muchos chicos y chicas, hombres y mujeres, se contagian con una ETS después de haber tenido relaciones sexuales "solamente" con una o dos personas "especiales". En la mayoría de los casos el contagio se produjo porque alguna de las parejas "especiales" se había contagiado en otro lugar y en otro momento mediante el contacto con alguien también "especial".

Algunos que han sido descuidados o indiscriminados en su vida sexual han contraído una infección que ahora está inactiva u oculta. ¡Pero esa infección puede reavivarse e infectar a un cónyuge fiel o a sus hijos inocentes!

¡No piense que Dios ignora todo esto! Al contrario, Él va a reaccionar... y antes de lo que muchos esperan. ¡En nuestra generación! El Creador está dejando que la humanidad sufra por ahora las consecuencias naturales de su camino de vida.

Las leyes de Dios reveladas en la Biblia nos muestran cómo evitar casi todas las enfermedades transmisibles por vía sexual, o al menos cómo reducir a un mínimo absoluto el riesgo de contraerlas o propagarlas. (No olvidemos que algunos casos de ETS ocurren en matrimonios monógamos o aun en vírgenes.) La monogamia y la virginidad limitan enormemente la propagación de estas enfermedades. Y lo que ocasiona las epidemias de ETS es la conducta sexual promiscua y libre, y en algunos casos la falta de higiene.

Es necesario tratar a las personas afectadas. Pero la única manera de acabar con estas epidemias es mediante la *prevención*: llevando una vida recta en lo higiénico y lo sexual.

Las predicciones bíblicas en materia de relaciones prematrimoniales, extraconyugales y homosexuales. (Continúa en la página 28)

Dios creó el cuerpo humano y nos enseñó a usarlo correctamente. La sexualidad es para la unión en amor y fidelidad dentro del matrimonio sagrado. No se hizo para la concupiscencia, la perversión ni la promiscuidad.

pas). "Como cada uno de estos embarazos representa una muerte fetal, esto constituye una verdadera epidemia de muertes fetales", dice una autoridad.

Supergonorrea también

La primera cepa de gonorrea totalmente resistente a la penicilina se descubrió en los Estados Unidos en 1976. Parece que llegó del Asia, donde surgieron cepas superresistentes a raíz del autotratamiento errado hecho por prostitutas. Desde entonces la gonorrea superresistente se ha extendido a más y más países.

Autoridades de salud en todo el mundo están alarmadas por el creciente número de cepas de gonorrea que se han hecho resistentes a todos los antibióticos salvo los más fuertes y costosos. "Nuestras balas de acero se están convirtiendo en caucho", comentó un funcionario de salud.

Otro hallazgo inquietante resalta la inutilidad de pretender controlar las epidemias de ETS tratando los efectos en vez de las causas. Se cree que la mayoría de los hombres infectados de gonorrea presentaban síntomas precoces que les haría ir en busca de tratamiento. Pero muchos estudios demuestran que entre el 15 y el 50 por ciento de estos varones son asintomáticos, es decir, que no manifiestan los primeros síntomas pero siguen propagando la enfermedad.

Los síntomas precoces en los va-

la luz una crisis que ya existía desde hace mucho tiempo entre los varones homosexuales: el aumento vertiginoso en los casos de ETS. Algunas autoridades consideran que los episodios frecuentes de ETS sufridos por muchos homosexuales los debilitan haciéndolos más propensos a sufrir los estragos del SIDA.

Cada vez que se introduce una ETS u otra enfermedad contagiosa dentro de un grupo promiscuo, prolifera como un incendio. Los médicos de Inglaterra y los Estados Unidos informan que la hepatitis A y B, enfermedades virales graves que causan ictericia e insuficiencia hepática, están aumentando velozmente entre los homosexuales. Algunos calculan que la sífilis y la hepatitis son 10 veces más frecuentes entre los homosexuales que entre los heterosexuales, debido a la naturaleza de sus costumbres.

La insensatez y el peligro de las relaciones sexuales promiscuas y desviadas son mucho mayores de lo que suele imaginarse la gente.

Dios creó el cuerpo humano y nos enseñó a usarlo correctamente. La vía intestinal se hizo para eliminar los desechos humanos y las toxinas. Los órganos sexuales de hombres y mujeres se hicieron para la eliminación de desechos urinarios y para la unión en amor y fidelidad dentro del matrimonio sagrado. No se hicieron para la concupiscencia, la perversión ni la promiscuidad. ¡Hay

Peligros del uso del DAIU

Según estudios realizados por el Instituto Nacional para la Salud Infantil y el Desarrollo Humano (EE.UU.), las mujeres que han utilizado dispositivos anticonceptivos intrauterinos (DAIU) para el control de la natalidad pueden haber aumentado el riesgo de convertirse

en estériles.

Estos estudios vincularon por primera vez el uso del DAIU con la enfermedad inflamatoria pélvica, una de las causas de la infertilidad. Alrededor de 88 000 mujeres norteamericanas que quedaron estériles después de esta enfermedad pudieron haberla adquirido debido al uso de un DAIU.

El dispositivo intrauterino es un pequeño dispositivo de plástico o de plástico recubierto de cobre que debe

ser insertado en el útero por un médico. Su gran popularidad se debe a su comodidad (una vez colocado puede permanecer allí hasta por cinco años), y su efectividad es de un 95%. El DAIU es utilizado por aproximadamente 2,2 millones de mujeres norteamericanas.

El director del estudio subrayó que esto "no significa que todas las mujeres que han utilizado un dispositivo intrauterino quedarán estériles. La mayoría de las mujeres los pueden utilizar sin ningún problema".

Otros estudios han vinculado el uso de ciertas marcas del DAIU con ciertas complicaciones, como un gran incremento del flujo menstrual, perforaciones del útero, creciente incidencia de embarazos tubáricos y, en el caso de embarazos accidentales, abortos es-

pontáneos en el segundo trimestre (con mayor riesgo para la madre), nacimientos



prematuros o niños nacidos muertos.

Además de los riesgos para la salud, algunos consideran los dispositivos intrauterinos como abortivos, ya que impiden la implantación del óvulo fertilizado en la pared uterina. ■



Los jóvenes aplazan el matrimonio

El número de jóvenes que se casan está disminuyendo. Y los que se casan, lo están haciendo a una edad un poco más avanzada, según estadísticas provenientes de varios países, entre ellos Inglaterra, Holanda y Suráfrica.

La tasa de matrimonios de parejas jóvenes llegó a su punto más bajo el año pasado en Inglaterra, según la Oficina de Censos y Encuestas Demográficas. El número de jóvenes que se casan antes de los 20 años se redujo a la mitad en la década pasada y en sólo 1984 la reducción fue más del 10%. Hace 10 años, una inglesa de cada tres se casaba antes de los 20 años; el año pasado, la cifra se había reducido a una en

cinco. El número de varones que se casan antes de los 25 años de edad también se ha reducido.

Entre los hombres holandeses, la edad promedio para el primer matrimonio era de 25,3 años en 1978; en 1983 era de 26 años. Para la mujer, las edades

eran 23 años en promedio para 1978 y 23,7 para 1983.

En Suráfrica, 7.797 muchachas menores de 20 años se casaron en 1982, comparado con 9.296 en 1973. En 1982 se casaron 975 varones menores de 20 años, mientras que en 1973 la cifra había sido de 2.237. Entre tanto, el número de di-

vorcios en Suráfrica casi se duplicó durante el mismo periodo.

Muchos jóvenes permanecen más tiempo en la casa paterna debido a las condiciones económicas precarias. Otros factores son la moda de convivir sin el lazo matrimonial y el deseo de cumplir otras metas en la vida antes de casarse. ■

¿Relaciones sexuales antes del matrimonio?

Una encuesta reciente ha revelado que por primera vez desde que se empezó a estudiar el tema (hace 20 años), la mayoría de los adultos norteamericanos consideran que las relaciones sexuales prematrimoniales son aceptables.

¿Son aceptables las relaciones sexuales prematrimoniales?

Año	No	Sí	Indecisos
1969	68%	21%	11%
1973	48%	43%	9%
1985	39%	52%	9%

Infectado

(Viene de la página 24)

les, y las enseñanzas en materia de higiene (el tratamiento sanitario de los desechos humanos y de las plagas abiertas) son principios físicos y espirituales activos y vivientes que el Creador mismo instauró.

Las leyes de Dios se hicieron para proteger la unidad familiar y a cada uno de sus miembros. Son leyes que protegen y promueven el desarrollo de las sociedades y naciones que las obedezcan. Cuando se incumplen, traen maldiciones sociales inimaginables.

Pocos saben que la Biblia profetizó las alarmantes epidemias de enfermedades sociales que son materia de este artículo. Nótese la profecía de Deuteronomio 28: "Si no cuidares de poner por obra todas las palabras de esta ley que están escritas en este libro... entonces el Eterno aumentará maravillosamente tus plagas y las plagas de tu descendencia, plagas grandes y permanentes, y enfermedades malig-

nas y duraderas... Asimismo toda enfermedad y toda plaga que no está escrita en el libro de esta ley, el Eterno la enviará [Dios permitirá que venga] sobre ti..." (versículos 58-59, 61).

La prevención es lo único que puede detener la epidemia de ETS. Esto significa que las personas solteras o casadas que deseen evitar estas enfermedades tendrán que evitar por completo las prácticas sexuales pervertidas, homosexuales, extraconyugales o prematrimoniales, todas las cuales constituyen pecados atroces a los ojos de Dios.

Ahora bien, supongamos que usted ha contraído una ETS incurable o difícil de curar. Si dentro del matrimonio existe alguna infección de este tipo, no debe haber relaciones sexuales mientras haya infección, cualquiera que sea la etapa de la misma. Si ya no la hay, debe consultarse primero a un médico de buena reputación y conocedor de estas enfermedades.

Solamente usted puede tomar la decisión de ir contra la corriente

del libertinaje sexual. La información y las advertencias en este artículo, y lo que es más importante, en la revelación de Dios que es la Santa Biblia, lo dejan a usted sin excusa. Si se deja arrastrar hacia las relaciones sexuales extramatrimoniales o promiscuas después de haber recibido este conocimiento, usted será las consecuencias!

Usted y sus hijos tienen que conocer la realidad acerca de estas enfermedades. Ustedes pueden vivir de tal manera que la "epidemia silenciosa" no los cuente entre sus víctimas. □

Fotografías e ilustraciones: Página 4: Sygma. Página 5: Cole — PV. Página 6: Martin Rotker — Taurus. Páginas 7-8: Norman Merritt. Página 15: Belluche — PV. Página 23: Martin Rotker — Taurus. Página 25: Wolverson — PV. Página 26: arriba, Cole — PV; abajo, Wendy Lagerström. Página 27: izquierda, Belluche — PV; derecha, Wolverson — PV. Contraportada: arriba, M. Faulkner — PV; centro, Norman Merritt; abajo, Belluche — PV.

Científicos

(Viene de la página 3)

Un veterano del proyecto Manhattan, director del *Bulletin of the Atomic Scientist* (Boletín del científico atómico), dice en su editorial de agosto de 1985 que una guerra nuclear en la que estallen de 5.000 a 10.000 megatones podría matar en el acto a mil millones de personas, mientras que otros mil millones sucumbirían después a causa de las heridas, los incendios y la irradiación.

Con todo, las especulaciones acerca de un "invierno nuclear" causado por el polvo y el humo en la atmósfera, que impedirían la entrada de la luz solar y causarían drásticos descensos en la temperatura y una catastrófica disminución de la producción agrícola, indican que el número de muertes podría elevarse a cuatro mil millones, es decir, ¡el 90 por ciento de la población de la tierra!

¡Imagínese usted! ¡La posibilidad de que sólo quede una décima parte de la humanidad! Y puede ser aun peor si los efectos del invierno nuclear se desplazan hacia el sur del ecuador donde quedaría el 10 por

ciento restante de las vidas humanas. (Casi todos los grandes centros de población, incluso la India, se encuentran en el hemisferio norte.)

De manera que toda la humanidad está bajo la amenaza de la posibilidad de la extinción, hecho que confirma la realidad de Mateo 24:22: "Si no se acortasen aquellos días, nadie escaparía con vida" (Nueva Biblia Española).

Uno de los veteranos del proyecto Manhattan insiste en la urgencia de comenzar un desarme nuclear, "en allanar el camino para que se ponga orden a la anarquía internacional que sufre el mundo entero".

Estos veteranos ven la imperiosa necesidad de la "creación de una maquinaria verdaderamente efectiva para guardar la paz", para que "las disputas internacionales al igual que las acciones de guerra" puedan ser controladas por medio de "un código legal global respaldado por una maquinaria legal, militar y económica indispensable para hacer cumplir con firmeza las medidas que se requieran".

Lo que estos veteranos describen, en sus propios términos, no es sólo una absoluta necesidad sino lo

que va a ocurrir pronto en este planeta azotado por la guerra. Los políticos, empero, no pueden llevar esto a cabo.

Lo que va a suceder en la tierra es la llegada del gobierno de Dios encabezado por Jesucristo mismo. Este gobierno hará cumplir el único "código legal global" que puede hacer que todos los hombres vivan en paz y en prosperidad. Dicho código es la ley de Dios. Este código estará respaldado por "la maquinaria legal, militar y económica" y por el poder necesario para establecer la paz en el mundo entero (ver Apocalipsis 2:26).

Muchos de los científicos, educadores y políticos más preclaros del mundo saben que se necesita urgentemente un gobierno mundial. Lo que no pueden ver es cómo puede ser establecido. Uno de estos científicos dice: "No soy tan ingeniero como para pensar que un gobierno mundial bien desarrollado pueda ser establecido en un futuro cercano".

La Escritura revela cómo será establecido. En las palabras del mismo Jesucristo, el Rey de reyes: "Para los hombres es imposible, mas para Dios todo es posible". □